Les hernies de l'aine
Cas clinique n°1

Mme H H âgée de 75 ans, diabétique sous antidiabétiques oraux, priseuse chronique de Neffa consulte aux urgences pour une diarrhée apparue depuis 48h, associée à des douleurs de la racine de la cuisse.

A l'examen :

- Etat général altéré
- Cernes oculaires
- Plis cutanés paresseux.
- Température : 38°Cs
- Poids : 95 kg
- Taille : 162 cm
- TA : 90/60 mmhg
- L'abdomen est souple, indolore à la palpation.
- Les touchers pelviens sont normaux.

Question n°1(QROC)

A quel diagnostic pensez-vous ?
Réponse :……

Question n°2(QROC)

Comment confirmer ce diagnostic ? Réponse……
……
……
……

Question n° 3(QROC)
Quels sont les examens complémentaires que vous prescrivez et dans quel but ?
Réponse……
……
……
…….

Question n°4(QROC)
Cette patiente nécessite-t-elle une hospitalisation ? Si oui, dans quelle structure sanitaire ?
Réponse……
……
……..

Question n° 5(QROC)
Quels sont les moyens thérapeutiques que vous mettrez en œuvre ?
Réponse……
……
…….

Question n°6(QROC)
Quelle sera l'évolution en dehors de tout traitement?
Réponse…….

Cas clinique n°2

Mr **JJ** âgé de 65 ans consulte pour une hernie inguinoscrotale évoluant depuis six mois.

Question n°1(QCM)

Cocher les réponses justes.

L'anamnèse doit rechercher

1- Des antécédents de travail pénible.
2- Une nicturie.
3- Une bronchite chronique.
4- Une constipation d'apparition récente.
5- Un effort de port de charge lourde il y a six mois.

Réponse :…….

Question n°2(QROC)

Quel est le type anatomique de cette hernie ?

Réponse :……

Question n°3(QCM)

Cochez les réponses justes.

Le traitement chirurgical de la hernie inguinale.

1- Doit être entrepris dés que le diagnostic est posé.
2- Consiste à renforcer le fascia transversalis.
3- Peut être fait en ambulatoire
4- Expose à une mortalité supérieure à 10%.
5- Les récidives sont favorisées par la reprise précoce de l'activité professionnelle.

Réponse :……

Question n°4(QROC)

Mr jj est perdu de vue, il reconsulte après six mois aux urgences pour une hernie étranglée.

Décrivez quatre caractères sémiologiques de cette hernie étranglée?

Réponse……
…….

Question n°5(QCM)

Cochez la ou les réponses justes.

Le traitement consiste à :

1- Faire une réanimation de brève durée puis opérer le patient.
2- Faire un taxis puis programmer une chirurgie à froid.
3- Opérer le patient en deux temps : lever l'étranglement puis réaliser la cure pariétale.
4- Opérer le patient en urgence et poser systématiquement une prothèse.
5- Mettre en place une sonde naso-gastrique en aspiration pendant 6h et opérer le patient en cas de persistance de l'étranglement.

Réponse :……..

Question n°6(QROC)

Ce patient a été opéré, l'ouverture du sac trouve des anses intestinales d'aspect et de péristaltisme normaux.

Quelle est la précaution à prendre avant de réintégrer les anses intestinale dans la cavité péritonéale pour ne pas méconnaître un étranglement en **W**.

Réponse……..

Question n°1(QCM)

Cochez les réponses justes
Le Trou musculo-pectinéal.

1- Est une zone de faiblesse de la paroi abdominale.
2- Est séparé en région inguinale et région fémorale par l'arc ilio-pectiné.
3- Est limité en bas par le ligament inguinal.
4- Est limité en dehors par le muscle psoas recouvert de son fascia.
5- Livre passage aux vaisseaux fémoraux et au cordon spermatique chez l'homme.

Réponse……

Question n°2(QCM)

Cochez les réponses justes

La hernie inguinale chez le Nourrisson.

1- Est toujours une hernie oblique externe.
2- Est toujours en rapport avec une persistance du canal péritinéo-vaginal.
3- Elle doit être opérée dés que le diagnostic de hernie a été posé.
4- Elle s'étrangle exceptionnellement.
5- Le taxis est le traitement de choix des étranglements évoluant depuis moins de six heures.

Réponse :……