ESSEC
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES
Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur Reconnu par l'Etat

CONCOURS D'ADMISSION de 1981

MATHEMATIQUES - 1ère épreuve

(Coef. 5)

Jeudi 7 mai 1981 de 8h à 12h

Soit $\mathbb{R}[x]$ l'ensemble des polynômes en x à coefficients réels et $\mathbb{R}_n[x]$ la partie de $\mathbb{R}[x]$ formée par l'ensemble des polynômes de degré n au plus ; on pose $\mathbb{R}_3[x] = X$.

Dans tout le problème s désigne une constante réelle donnée.

Enfin, si un polynôme s'introduit sous l'aspect d'une fraction rationnelle, il en est par définition la forme réduite, que l'on obtiendrait après simplification car le numéreteur est un multiple du dénominateur.

I - A. A tout polynôme P on associe $\hat{P}$ défini par $\hat{P}(x) = \frac{1}{x-s} \int_s^x P(t)\,dt$.

1. Montrer que $\hat{P}$ est un polynôme.

2. Soit $\bar{u}$ l'application définie par $\bar{u}(P) = \hat{P}$. Montrer que $\mathbb{R}_0[x] = \mathbb{R}$, $\mathbb{R}_1[x]$, $\mathbb{R}_2[x]$, ..., $\mathbb{R}_n[x]$ ..sont stables par $\bar{u}$.

3. Montrer que $\bar{u}$ est un automorphisme de l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}[x]$.

B. Soit u la restriction de $\bar{u}$ à X .

1. Montrer que u admet quatre valeurs propres λ_0, λ_1, λ_2 et λ_3 . On les indexe pour avoir $\lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1 < \lambda_0$.

2. Expliciter une base (T_0, T_1, T_2, T_3) constituée de vecteurs propres, T_k étant associé à la valeur propre λ_k , $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.

3. Décomposer x^3 sur T_0, T_1, T_2 et T_3 .

./.

C. On pose $L(x) = (x-\lambda_0)(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)$ puis on définit quatre polynômes par $L_0(x) = \frac{4\,L(x)}{x-\lambda_0}$, $L_1(x) = \frac{-48\,L(x)}{x-\lambda_1}$, $L_2(x) = \frac{108\,L(x)}{x-\lambda_2}$ et $L_3(x) = \frac{-64\,L(x)}{x-\lambda_3}$

1. Calculer $L_0 + L_1 + L_2 + L_3$.

2. Calculer $L_0 + \frac{1}{2}L_1 + \frac{1}{3}L_2 + \frac{1}{4}L_3$.

3. Si, dans un polynôme en x nous remplaçons l'indéterminée x par u et le produit par la composée d'endomorphismes, nous obtenons un polynôme en u. Par exemple $2x^3 - 4x^2 + 1$ donnerait $2.u^3 - 4u^2 + I_d$; ici u^2 est l'application $u \circ u$ et I_d l'application identique.

On pose : $\ell = L(u)$, $\ell_0 = L_0(u)$, $\ell_1 = L_1(u)$, $\ell_2 = L_2(u)$ et $\ell_3 = L_3(u)$.

a) Déterminer ℓ .

b) Calculer, pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, les endomorphismes $\ell_k^2 - \ell_k$.

c) Expliciter les espaces images $\ell_0(X)$, $\ell_1(X)$, $\ell_2(X)$ et $\ell_3(X)$.

II - A. A tout polynôme $P \in \mathbb{R}[x]$ on associe le polynôme $\tilde{P}$ défini par :

$$\tilde{P}(x) = \frac{1}{(x-s)^2} \cdot \int_s^x \left(\int_s^y P(t)\,dt \right) dy .$$

et on pose $\bar{v}(P) = \tilde{P}$.

1. Calculer $\bar{v}(H)$ où $H(x) = x+1$.

2. Montrer que $\bar{v}$ est un automorphisme de $\mathbb{R}[x]$.

B. Soit v la restriction de $\bar{v}$ à X .

1. Montrer que v est un isomorphisme de X .

2. Expliciter v sous la forme d'un polynôme en u .

3. Montrer que v est un polynôme en u^2 .

4. L'endomorphisme $v-u^2$ est-il injectif ?

./.

C. On considère six nombres réels et distincts α_1, α_2, α_3, α_4, α_5 et s ; s est toujours le nombre introduit dans le préambule.
On pose $A(x) = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3)(x-\alpha_4)$.
Pour $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ on définit $A_p(x)$ par $A_p(x) = \dfrac{A(x)}{(x-\alpha_p)\,A'(\alpha_p)}$.

Enfin pour $p \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ on définit g_p par $g_p(P) = \tilde{P}(\alpha_p)$.

1. Pour $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ et $q \in \{1, 2, 3, 4\}$, calculer $A_p(\alpha_q)$.

2. Montrer que les applications g_i sont des formes linéaires ; quel est le rang de la famille $(g_1, g_2, g_3, g_4, g_5)$?

3. Comment déterminer quatre polynômes B_1, B_2, B_3 et B_4 qui, pour $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ et $q \in \{1, 2, 3, 4\}$, vérifient :

$g_p(B_p) = 1$ et, pour $p \neq q$, $g_p(B_q) = 0$?

4. Pour $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ on pose $B_p = b_{p,0}\,T_0 + b_{p,1}\,T_1 + b_{p,2}\,T_2 + b_{p,3}\,T_3$.

Expliciter les coefficients $b_{p,k}$ à l'aide des valeurs prises par A_p ou ses dérivées en $x = s$.

D. Les combinaisons linéaires en g_1, g_2, g_3 et g_4 demandées dans ce paragraphe ont des coefficients qui s'expriment simplement en fonction des valeurs prises par $A_k(x)$ ou $A_k'(x)$ en des points appartenant à $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}$.
Seules seront retenues les réponses qui se présenteront sous cet aspect.

1. Expliciter g_5 comme combinaison linéaire de g_1, g_2, g_3 et g_4.

2. On définit f par $f(P) = \tilde{P}'(\alpha_5)$ expliciter f comme combinaison linéaire de g_1, g_2, g_3 et g_4. ($\tilde{P}'$ est la dérivée de $\tilde{P}$).

3. Posant $f_i(P) = \hat{P}(\alpha_i)$ pour $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, expliciter f_i comme combinaison linéaire de g_1, g_2, g_3 et g_4.

III - <u>Application</u> On prend $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, s) = (1, -1, 2, -2, 3, 0)$.

1. Expliciter les quatre polynômes B_1, B_2, B_3 et B_4 sur la base canonique x^3, x^2, x et 1.

2. Donner les coefficients de la décomposition de g_5 sur g_1, g_2, g_3 et g_4.

3. Donner les coefficients de la décomposition de f sur g_1, g_2, g_3 et g_4.

www.tunisie-etudes.info

Ce document a été téléchargé depuis
www.tunisie-etudes.info

Des documents gratuits, devoirs, examens, cours, exercices, corrigés... Ainsi que toute une rubrique pour vous aider à trouver un emploi sans oublier les avis de concours en direct

Notre page Twitter :
http://www.twitter.com/TunisieEtudes
Notre page FaceBook :
http://www.facebook.com/TunisieEtudes



Merci d'avoir choisi www.tunisie-etudes.info
Bonne lecture et bon travail