www.tunisie-etudes.info

Ce document a été téléchargé depuis
www.tunisie-etudes.info

Des documents gratuits, devoirs, examens, cours, exercices, corrigés... Ainsi que toute une rubrique pour vous aider à trouver un emploi sans oublier les avis de concours en direct

Notre page Twitter :
http://www.twitter.com/TunisieEtudes
Notre page FaceBook :
http://www.facebook.com/TunisieEtudes



Merci d'avoir choisi www.tunisie-etudes.info
Bonne lecture et bon travail

PREMIÈRE COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

DURÉE : 4 heures

Dans tout le problème, p désigne un nombre entier premier et $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ des entiers modulo p.

On propose ici une étude des polynômes irréductibles modulo p, c'est-à-dire à coefficients dans $\mathbb{F}_p$. On montre, en particulier, que pour tout nombre premier p et tout nombre entier n, il existe un polynôme irréductible unitaire sur $\mathbb{F}_p$ *de degré n sans qu'on sache fournir explicitement un tel polynôme.* On étudie également une *formule d'inversion de Möbius* qui permet de dénombrer l'ensemble de ces polynômes.

PARTIE I : Calculs en caractéristique p

1. Montrer que $\binom{p}{i} \equiv 0 \pmod{p}$ pour $0 < i < p$ où $\binom{p}{i}$ désigne le coefficient binomial, coefficient de X^i dans le développement du binôme $(X+1)^p$.
2. Soit K un corps commutatif contenant le corps $\mathbb{F}_p$; déduire de la question précédente que $(x+y)^p = x^p + y^p$ pour $x, y \in K$, puis que $R(x^{p^n}) = R(x)^{p^n}$ pour tout $x \in K$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout polynôme R *à coefficients dans* $\mathbb{F}_p$.

PARTIE II : L'anneau-quotient $k[X]/(Q)$

Dans cette partie, k désigne un corps commutatif quelconque, Q un polynôme à coefficients dans k, de degré $\geqslant 1$, et (Q) l'idéal de $k[X]$ engendré par Q.

On définit une relation d'équivalence $\mathfrak{R}$ sur $k[X]$ par $R \mathfrak{R} S \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} R - S \in (Q)$; on note $A = k[X]/(Q)$ l'ensemble des classes d'équivalence modulo $\mathfrak{R}$ et $\overline{R}$ la classe de $R \in k[X]$ ($\overline{R} \in A$).

1. *a.* Vérifier (rapidement) que les lois suivantes sont bien définies et confèrent à $A = k[X]/(Q)$ une structure d'algèbre sur k, commutative et unitaire :

$$\overline{R} + \overline{S} = \overline{R+S}; \qquad \overline{R} \times \overline{S} = \overline{R \times S}; \qquad \lambda\overline{R} = \overline{\lambda R} \qquad \text{et} \qquad (R, S \in k[X], \lambda \in k)$$

Vérifier également que l'application $k \in \lambda \mapsto \overline{\lambda} \in A$ est un morphisme injectif qui permet d'identifier le corps k à un sous-anneau de A.

b. Montrer que tout élément de A s'écrit $R(\overline{X})$ où R est un polynôme *à coefficients dans k.*

c. Expliciter une base de A en tant qu'espace vectoriel sur k; quelle est la dimension de cet espace vectoriel ?

2. *a.* Caractériser les éléments $R \in k[X]$ tels que $\overline{R} \in A$ soit inversible dans A.

b. En déduire une condition nécessaire et suffisante, portant sur le polynôme Q, pour que $A = k[X]/(Q)$ soit un corps. À titre d'exemple, quels sont les corps parmi $\mathbb{F}_2[X]/(X^2+X+1)$, $\mathbb{F}_{11}[X]/(X^2+1)$, $\mathbb{F}_{13}[X]/(X^2+1)$?

PARTIE III : Les facteurs irréductibles de $X^{p^n} - X$

Dans cette partie, Q désigne un polynôme *irréductible* de $\mathbb{F}_p[X]$ de degré d; on note K le corps $\mathbb{F}_p[X]/(Q)$ et $\overline{X}$ la classe de X dans ce quotient.

1. Quel est l'ordre du groupe multiplicatif $K^* = K - \{0\}$? En déduire que $y^{p^d-1} = 1, \forall y \in K^*$.

2. On suppose, dans cette question que $d = \deg(Q)$ divise n; déduire de la quesion précédente que $\overline{X}^{p^n} = \overline{X}$ puis que Q divise $X^{p^n} - X$.

Tournez la page S.V.P.

3. On suppose, dans cette question, que Q divise $X^{p^n} - X$.

   a. Montrer que $\overline{X}^{p^n} = \overline{X}$ puis que $y^{p^n} = y$, $\forall\, y \in K$.

   b. Soit r le reste dans la division euclidienne de n par d; montrer que : $y^{p^r - 1} = 1$, $\forall\, y \in K^*$.

   c. En déduire que le polynôme $Y^{p^r - 1} - 1$ est le polynôme nul puis que $d = \deg(Q)$ divise n.

4. Montrer que le polynôme $X^{p^n} - X$ est sans facteur carré puis que : $$X^{p^n} - X = \prod_{d \mid n} \prod_{Q \in K_p^d} Q.$$

K_p^d désignant l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré d sur $\mathbb{F}_p$.

PARTIE IV : Dénombrement des polynômes irréductibles

On désigne, dans cette partie par I_p^n le nombre de polynômes *irréductibles unitaires* de degré n sur $\mathbb{F}_p$.

1. En utilisant le résultat de la question III.4., montrer que : $$(*) \qquad p^n = \sum_{d \mid n} d I_p^d.$$

2. Déduire de la question précédente que $p^d \geqslant d I_p^d$, puis que $I_p^n \geqslant 1$, autrement dit qu'il existe au moins un polynôme irréductible modulo p en tout degré.

3. Donner les valeurs de I_p^1 et de I_p^n pour n *premier*. Montrer que la formule (*) ci-dessus permet de calculer I_p^n par une formule récurrente en n.

4. On désire, dans cette question, retrouver directement la valeur de I_p^2 puis « expliciter » les I_p^2 trinômes unitaires irréductibles sur $\mathbb{F}_p$.

   a. Donner un argument autre que celui fourni par la relation (*) permettant de calculer I_p^2. Expliciter les I_2^2 polynômes unitaires irréductibles sur $\mathbb{F}_2$.

   On suppose maintenant $p \neq 2$.

   b. Montrer que l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_p^*$ contenant exactement $(p-1)/2$ éléments.

   c. En déduire la forme des I_p^2 trinômes unitaires irréductibles de $\mathbb{F}_p[X]$ puis de nouveau la valeur de I_p^2. À titre d'exemple, on explicitera les I_5^2 trinômes unitaires irréductibles de $\mathbb{F}_5[X]$.

PARTIE V : La formule d'inversion de Möbius

Soit une égalité : $$(**) \qquad f(n) = \sum_{d \mid n} g(d), \qquad n \geqslant 1.$$

où f et g sont deux fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$; on désire exprimer g en fonction de f. Ce résultat sera appliqué au calcul de I_p^n.

On désigne par $\mathfrak{F}$ l'ensemble de toutes les fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$, muni de l'addition ordinaire des fonctions et du produit *arithmétique* défini par :

$$(f * h)(n) = \sum_{d \mid n} f(d)\, h(n/d), \qquad n \geqslant 1.$$

1. Vérifier que $\mathfrak{F}$ est un anneau commutatif et unitaire; quel est son élément unité, que l'on notera χ ?

2. Montrer que $f \in \mathfrak{F}$ est inversible dans $\mathfrak{F}$ si et seulement si $f(1) \neq 0$.

Tournez la page S.V.P.

3. On définit la fonction μ de Möbius par :

$$\begin{cases} \mu(1) = 1. \\ \mu(p_1 p_2 \dots p_k) = (-1)^k, \text{ si } p_1, p_2, \dots p_k \text{ sont des premiers } \textit{distincts.} \\ \mu(n) = 0, \text{ sinon (c'est-à-dire si } n \text{ est divisible par un carré).} \end{cases}$$

et par cst_1 la fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ constamment égale à 1 .

a. Calculer $\mu \bullet cst_1$.

b. Soient f et g dans $\mathfrak{F}$, liées par une égalité (**); déduire de ce qui précède qu'on peut exprimer g en fonction de f par :

$$g(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) f(n/d).$$

4. En déduire une formule exprimant I_p^n.

PARTIE VI : De nombreux polynômes ... mais un seul corps

Dans cette partie, on fixe un nombre entier n et on s'intéresse aux corps *commutatifs* à p^n éléments ; on souhaite démontrer que deux tels corps sont isomorphes.

1. Montrer l'existence d'un corps *commutatif* ayant p^n éléments et préciser sa construction.

On désigne maintenant par K' un (autre) corps commutatif « abstrait » à p^n éléments.

2. *a.* En utilisant le noyau de l'application de $\mathbb{Z} \longrightarrow$ K' qui à $m \in \mathbb{Z}$ associe $m \times 1$ (1 est l'élément unité de K'), montrer l'existence d'un entier *premier* q tel que $qy = 0$ pour tout $y \in$ K'.

b. Montrer que $p = q$.

c. En déduire l'existence et l'unicité d'un isomorphisme de corps σ du corps $\mathbb{F}_p$ sur un sous-corps $\sigma(\mathbb{F}_p)$ de K'.

Si $Q = \sum_i \lambda_i X^i$ est un polynôme à coefficients dans $\mathbb{F}_p$, on note Q^σ le polynôme $\sum_i \sigma(\lambda_i) X^i$ à coefficients dans $\sigma(\mathbb{F}_p) \subset$ K'.

3. Soit $y \in$ K' ; vérifier que l'application $eval_y$ de $\mathbb{F}_p[X]$ dans K' définie par :

$$eval_y(Q) = Q^\sigma(y), \qquad Q \in \mathbb{F}_p[X],$$

est un morphisme d'anneaux.

4. On fixe un polynôme $P \in \mathbb{F}_p[X]$ irréductible de degré n auquel on associe le corps « concret » $K = \mathbb{F}_p[X]/(P)$; montrer que le polynôme P^σ admet une racine dans K'.

5. En déduire l'existence d'un isomorphisme du corps K sur le corps K'.

• • •

www.tunisie-etudes.info

Ce document a été téléchargé depuis
www.tunisie-etudes.info

Des documents gratuits, devoirs, examens, cours, exercices, corrigés... Ainsi que toute une rubrique pour vous aider à trouver un emploi sans oublier les avis de concours en direct

Notre page Twitter :
http://www.twitter.com/TunisieEtudes
Notre page FaceBook :
http://www.facebook.com/TunisieEtudes



Merci d'avoir choisi www.tunisie-etudes.info
Bonne lecture et bon travail