www.tunisie-etudes.info

Ce document a été téléchargé depuis
www.tunisie-etudes.info

Des documents gratuits, devoirs, examens, cours, exercices, corrigés... Ainsi que toute une rubrique pour vous aider à trouver un emploi sans oublier les avis de concours en direct

Notre page Twitter :
http://www.twitter.com/TunisieEtudes
Notre page FaceBook :
http://www.facebook.com/TunisieEtudes



Merci d'avoir choisi www.tunisie-etudes.info
Bonne lecture et bon travail

ESSEC
Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales
Etablissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat, affilié à la Chambre de commerce et d'industrie interdépartementale Val d'Oise Yvelines

CONCOURS D'ADMISSION DE 1990

MATHEMATIQUES I

Option générale

Vendredi 11 mai 1990 de 14h à 18h

Le but du problème est de déterminer la probabilité pour qu'un entier naturel appartienne à certains sous-ensembles de $\mathbb{N}$, ce qui fait l'objet de la partie II. Dans la partie I, on établit des résultats préliminaires d'Analyse.

Dans tout le problème, on désigne par x une variable réelle appartenant à [0, 1[et les fonctions considérées sont définies uniquement sur [0, 1[. En particulier, les limites ou équivalents en 1 supposent x inférieur à 1.

PRELIMINAIRE

Etant données deux suites réelles à termes positifs (x_n) et (y_n), on pose:

$$z_n = x_0 y_n + x_1 y_{n-1} + x_2 y_{n-2} + \ldots + x_{n-1} y_1 + x_n y_0 = \sum_{k=0}^{n} x_k y_{n-k}.$$

a) Prouver que, pour tout entier naturel n, on a:

$$\sum_{k=0}^{n} z_k \leq \left(\sum_{k=0}^{n} x_k\right).\left(\sum_{k=0}^{n} y_k\right) \leq \sum_{k=0}^{2n} z_k.$$

b) En déduire que, si les séries Σx_n et Σy_n sont convergentes de sommes respectives X et Y, alors la série Σz_n est convergente de somme $Z = XY$.

PARTIE I

On considère dans cette partie les deux suites de nombres réels (u_n) et (J_n) définies respectivement par:

- $u_0 = 1$ et $u_n = \dfrac{3.5.7 \ \ldots \ (2n+1)}{2.4.6 \ \ldots \ (2n)} = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{2k+1}{2k}$ pour $n \geq 1$.

- $J_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\, dt$.

1°)a) Etudier le sens de variation de la suite (J_n) et prouver sa convergence.
b) A l'aide d'une intégration par parties, déterminer une relation de récurrence entre J_n et J_{n-2} pour $n \geq 2$.
c) Calculer J_0 et J_1. En déduire les valeurs de J_{2n+1} et J_{2n} en fonction de u_n.

2°)a) Déduire successivement des résultats précédents les inégalités:

$$(1) \qquad 1 \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{u_n^2}{2n+1} \leq \frac{2n+1}{2n}.$$

$$(2) \qquad 0 \leq u_n - \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sqrt{n} \leq \frac{u_n}{2n+1}.$$

b) Déduire de (1) un équivalent de u_n lorsque n tend vers l'infini.

3°) Calculer l'intégrale suivante: $I(x) = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 - x\cos^2(t)}$

(on pourra poser $\tan(t) = \sqrt{1-x}.\tan(u)$).

.../...

4°)a) Démontrer que: $\sum_{k=0}^{n} J_{2k}\, x^k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 - x\cos^2(t)} - x^{n+1} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{2n+2}(t)dt}{1 - x\cos^2(t)}$.

b) Etablir l'inégalité suivante: $0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{2n+2}(t)dt}{1 - x\cos^2(t)} \leq \frac{J_{2n+2}}{1-x}$.

c) En déduire que: $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n x^n}{2n+1}$.

5°)a) Etablir par récurrence que: $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{u_k}{2k+1}$.

b) A l'aide du résultat préliminaire, en déduire que: $\frac{1}{(1-x)^{\frac{3}{2}}} = \sum_{k=0}^{+\infty} u_n x^n$.

6°) En utilisant les inégalités (2), établir:

a) la convergence de la série: $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{n}\, x^n$.

b) la double inégalité: $x \leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} (1-x)^{\frac{3}{2}} S(x) \leq 1$.

On donnera alors un équivalent de S(x) lorsque x tend vers 1.

PARTIE II

A toute partie A de $\mathbb{N}$ on associe la suite (a_n) définie par:

$$\begin{cases} a_n = 1 & \text{si } n \in A. \\ a_n = 0 & \text{si } n \notin A. \end{cases}$$

On pose alors, sous réserve d'existence de ces nombres:

$$f_A(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \text{et} \quad P(A) = \lim_{x \to 1} (1-x)\, f_A(x).$$

1°) Prouver que la série définissant $f_A(x)$ est convergente.
On notera S l'ensemble des parties A de $\mathbb{N}$ pour lesquelles P(A) existe.

2°) Etablir les propriétés suivantes:

a) Si A appartient à S, alors $0 \leq P(A) \leq 1$.

b) $\emptyset$ et $\mathbb{N}$ appartiennent à S. On précisera $P(\emptyset)$ et $P(\mathbb{N})$.

c) Si A appartient à S, alors son complémentaire $\overline{A}$ appartient à S. On précisera $P(\overline{A})$ en fonction de P(A).

d) Si A, B tels que $A \cap B = \emptyset$ appartiennent à S, alors AUB appartient à S. On précisera P(AUB) en fonction de P(A) et P(B).
On admettra désormais que ($\mathbb{N}$, S, P) est un espace probabilisé.

3°) Montrer que les parties A suivantes appartiennent à S et préciser P(A):

a) A partie finie de $\mathbb{N}$.

b) $A = q\mathbb{N} = \{ qk / k \in \mathbb{N} \}$ où q est un entier naturel non nul.

c) $A = q\mathbb{N}+t = \{ qk+t / k \in \mathbb{N} \}$ où t et q sont deux entiers naturels avec $q \neq 0$.

.../...

4°) On se propose dans cette question d'établir que la partie C de $\mathbb{N}$ constituée des carrés d'entiers naturels non nuls appartient à S, et de calculer P(C).
La suite (c_n) et la fonction f_C associées à C sont donc définies par:

$$\begin{cases} c_n = 1 & \text{si } n \in C \text{ (soit : } \exists k > 0,\ k^2 = n) \\ c_n = 0 & \text{si } n \notin C \end{cases} \qquad \text{et} \quad f_C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n^2}.$$

a) A l'aide de la question préliminaire, établir que:

$$\frac{f_C(x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} [\sqrt{n}].\, x^n$$

([a] désigne ici la partie entière de a, c'est à dire l'entier tel que $[a] \le a < [a]+1$).

b) Démontrer la double inégalité suivante:

$$0 \le \sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{n} x^n - \frac{f_C(x)}{1-x} \le \frac{1}{1-x}.$$

c) A l'aide des résultats de la partie I, en déduire un équivalent de $f_C(x)$ quand x tend vers 1. Prouver alors que C appartient à S et donner P(C).

5°) On admet dans cette question que la partie D de $\mathbb{N}$ constituée des entiers qui sont la somme des carrés de deux entiers naturels non nuls appartient à S, et l'on se propose de majorer P(D).
La suite (d_n) et la fonction f_D associées à D sont donc définies par :

$$\begin{cases} d_n = 1 & \text{si } n \in D \ (\text{soit : } \exists p > 0,\ \exists q > 0,\ p^2 + q^2 = n) \\ d_n = 0 & \text{si } n \notin D \end{cases}$$

$$\text{et} \quad f_D(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} d_n x^n.$$

On note v(n) le nombre des couples d'entiers naturels non nuls (p,q) tels que :

$$p^2 + q^2 = n.$$

a) Etablir que :

$$(f_C(x))^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} v(n) x^n.$$

b) Etablir que :

$$f_D(x) \le (f_C(x))^2.$$

En déduire un majorant de P(D).

c) En comparant d_n et v(n), montrer que l'on a plus précisément :

$$2 f_D(x) \le (f_C(x))^2 + f_C(x^2).$$

En déduire un nouveau majorant de P(D).

****

www.tunisie-etudes.info

Ce document a été téléchargé depuis
www.tunisie-etudes.info

Des documents gratuits, devoirs, examens, cours, exercices, corrigés... Ainsi que toute une rubrique pour vous aider à trouver un emploi sans oublier les avis de concours en direct

Notre page Twitter :
http://www.twitter.com/TunisieEtudes
Notre page FaceBook :
http://www.facebook.com/TunisieEtudes



Merci d'avoir choisi www.tunisie-etudes.info
Bonne lecture et bon travail