ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES,
ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE,
DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ETIENNE, DES MINES DE NANCY,
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE
ECOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 1997

MATHÉMATIQUES

DEUXIÈME ÉPREUVE
FILIÈRE PC
(Durée de l'épreuve : 3 heures)

L'emploi de la calculette est interdit.

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie : MATHÉMATIQUES II - PC.
L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PC, comporte 4 pages.

Soit E l'espace vectoriel réel des fonctions réelles continues, définies sur l'intervalle I = [0, 1]. Il est admis que l'application $f \mapsto \|f\|_\infty = \sup_{0\le x\le 1} |f(x)|$ est une norme sur E. Pour deux fonctions f et g de E, soit (f | g) l'expression :

$$(f \mid g) = \int_0^1 f(t)\, g(t)\, dt .$$

Il est admis que l'application $(f, g) \mapsto (f \mid g)$ est un produit scalaire sur E.

Soit K la fonction définie sur le carré I×I par la relation :

$$K(x,t) = \begin{cases} (1-t)x, & \text{si } x \le t, \\ t(1-x), & \text{si } x \ge t. \end{cases}$$

Il est admis que la fonction K est continue sur le carré C = I×I.

1°) Étude de la fonction K :

a. Comparer pour un point (x, t) du carré C les valeurs prises K(x,t) et K(t, x) par la fonction K. Tracer pour un réel t donné de l'intervalle]0, 1[le graphe de la fonction $K_t : x \mapsto K(x, t)$.

b. Calculer les deux intégrales ci-dessous :

$$I_1 = \iint_C K(x,t)\,dx\,dt , \quad I_2 = \iint_C K(x,t)^2\,dx\,dt .$$

Étant donnée une fonction f définie et continue sur l'intervalle I = [0, 1], nulle en 0 et en 1, il est admis qu'il existe une unique fonction $\tilde{f}$, définie sur $\mathbb{R}$, impaire, périodique de période égale à 2, dont la restriction à I est la fonction f.

c. Déterminer le développement en série de Fourier de la fonction $\tilde{K}_t$. En déduire que la fonction K_t est la somme d'une série trigonométrique uniformément convergente.

Étant donnée une fonction f de l'espace E, soit U(f) la fonction définie par la relation :

$$U(f)(x) = \int_0^1 K(x,t)f(t)\,dt\,.$$

Il est admis que l'application $f \mapsto U(f)$ est une application linéaire de E dans lui-même.

2°) L'application linéaire U :

a. Démontrer que, pour toute fonction f de l'espace vectoriel E, la fonction U(f) est deux-fois continûment dérivable. Comparer la dérivée seconde de la fonction U(f) à la fonction f. Déterminer la plus petite constante k telle que la dérivée première U(f)′ de la fonction U(f) vérifie, pour toute fonction f, l'inégalité : $\|U(f)'\|_\infty \leqslant k\,\|f\|_\infty$.

b. Démontrer que la fonction U(f) est égale à la somme d'une série trigonométrique uniformément convergente ; la préciser en posant : $b_n(f) = 2\int_0^1 f(t)\sin(n\pi t)\,dt$.

c. Démontrer que l'ensemble des réels $\|U(f)\|_\infty$ lorsque f est une fonction de E de norme égale à 1 ($\|f\|_\infty = 1$) est borné. Démontrer que l'application linéaire U : $f \mapsto U(f)$ est une application lipschitzienne de l'espace vectoriel normé $(E, \|\ \|_\infty)$ dans lui-même. Déterminer le réel $\|U\|$ défini par la relation :

$$\|U\| = \sup_{\|f\|_\infty = 1} \|U(f)\|_\infty\,.$$

d. Démontrer, pour toute fonction f de E et pour tout couple de réels x et y appartenant à l'intervalle I, la relation ci-dessous :

$$|U(f)(x) - U(f)(y)| \leqslant \frac{1}{2}|x - y|\,\|f\|_\infty.$$

e. Déterminer le noyau et l'espace image de l'application U. En déduire que l'application U, considérée comme une application linéaire de E sur U(E), est inversible et déterminer son inverse U^{-1}.

3°) Valeurs propres et vecteurs propres :

a. Démontrer que l'application $(f, g) \mapsto (U(f) \mid g)$ est un produit scalaire. En déduire que, si l'application linéaire U a des valeurs propres, ces valeurs propres sont strictement positives.

b. Déterminer les valeurs propres λ_n, $n = 1, 2, \ldots$, de l'application linéaire U. Montrer que les valeurs propres peuvent être rangées en une suite $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tendant vers 0. Démontrer que l'espace propre E_n associé à la valeur propre λ_n est un espace vectoriel de dimension 1. Soit φ_n une fonction engendrant l'espace E_n telle que $(\varphi_n \mid \varphi_n) = 1$.

c. Démontrer que, pour toute fonction f de E, la série de terme général

$$u_n(x) = \lambda_n (\varphi_n \mid f) \varphi_n(x) \text{ , } n = 1, 2, \ldots,$$

où x est un réel de l'intervalle I, est uniformément convergente. Comparer U(f)(x) et la somme h(x) définie par la relation :

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n (\varphi_n \mid f) \varphi_n(x) .$$

4°) Puissances successives de l'application U :

a. Pour un entier k donné strictement positif, l'application composée k-fois de U avec elle-même est notée U^k. Démontrer que, pour toute fonction f de l'espace E, la fonction $U^k(f)$ est la somme d'une série de fonctions construites avec les fonctions $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

b. Soit k un entier naturel ; soit p_k la fonction définie par la relation $p_k(x) = x^k$ ($p_0(x) = 1$). Déterminer l'image de la fonction p_k par U : $U(p_k)$.

c. Calculer l'image $U^2(p_0)$ par l'applications U^2 de la fonction p_0. Démontrer que, plus généralement, l'image $U^k(p_0)$ de la fonction p_0 par l'application U^k est la restriction d'une fonction polynôme à l'intervalle I. Préciser son degré et le coefficient du terme de degré le plus élevé.

5°) Un problème d'Helmholtz :

Le but de cette question est de déterminer une fonction g deux-fois continûment dérivable qui vérifie les relations (**H**) ci-dessous :

$$\textbf{(H)} \qquad \begin{cases} \forall x \in I, \ -g''(x) = \lambda\, g(x) + h(x), \\ \qquad g(0) = 0, \ g(1) = 0. \end{cases}$$

Le réel λ est une constante donnée ; la fonction réelle donnée h est continue sur l'intervalle I. Le but poursuivi est de déterminer la fonction g comme somme d'une série trigonométrique. Résoudre les équations **(H)** c'est résoudre un problème d'Helmholtz.

a. Démontrer que, déterminer cette fonction g est équivalent à rechercher une fonction g appartenant à l'espace E vérifiant l'équation suivante

$$\textbf{(I)} \qquad g = \lambda\, U(g) + k\ .$$

où k est une fonction qui appartient à un sous-espace vectoriel de E qui sera précisé.

b. Dans cette question il est supposé qu'il existe une fonction g qui appartienne à E et vérifie l'équation **(I)** ; soit $(b_n(g))_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite des réels définis par la relation :

$$b_n(g) = 2\int_0^1 g(t)\sin(n\pi t)\,dt \ , \ n=1, 2, \ldots..$$

Est-ce que la série de terme général $b_n(g)\sin(n\pi x)$, $n\in\mathbb{N}^*$, est uniformément convergente dans I ?

Établir les relations vérifiées par ces réels $b_n(g)$, $n\in\mathbb{N}^*$.

Démontrer qu'il existe une suite de réels μ_n, $n\in\mathbb{N}^*$, tels que, lorsque le réel λ est différent de tous les réels μ_n, $n\in\mathbb{N}^*$, les coefficients $b_n(g)$, $n\in\mathbb{N}^*$, sont définis de manière unique. Les calculer.

c. Est-ce que le procédé utilisé à la question précédente permet de construire une solution de l'équation **(I)**, lorsque le réel λ est différent de tous les réels μ_n, $n\in\mathbb{N}^*$?

d. Discuter les équations obtenues à la question 5°.b, donnant les coefficients $b_n(g)$, $n=1, 2, \ldots.$, lorsque le réel λ est égal à l'un des réels μ_n. En déduire éventuellement une solution de l'équation **(I)**.

www.tunisie-etudes.info

Ce document a été téléchargé depuis
www.tunisie-etudes.info

Des documents gratuits, devoirs, examens, cours, exercices, corrigés... Ainsi que toute une rubrique pour vous aider à trouver un emploi sans oublier les avis de concours en direct

Notre page Twitter :
http://www.twitter.com/TunisieEtudes
Notre page FaceBook :
http://www.facebook.com/TunisieEtudes



Merci d'avoir choisi www.tunisie-etudes.info
Bonne lecture et bon travail