Exercice n°1 :

Soit $E = \mathbb{R}^3$, l'espace affine euclidien orienté de dimension 3 rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

A tout réel t, on associe la droite Δ_t définie par les équations :

$$x\cos t + y\sin t - 1 = 0$$
$$x - z\cos t = 0$$

Soit $\mathcal{S}$ la surface engendrée par les droites Δ_t pour t réel.

1°) Que peut-on dire des droites Δ_t et $\Delta_{t+2\pi}$, Δ_t et $\Delta_{\pi-t}$, Δ_t et Δ_{-t} ?
En déduire l'existence de symétries pour $\mathcal{S}$.

2°) Établir que la droite Δ_t est tangente au cylindre de révolution d'axe $(O,\vec{k})$ et de rayon 1 en un point situé dans le plan d'équation $z = 1$ et qu'elle est coplanaire avec la droite d'équations $x = 0$ et $z = 0$.
Étudier la réciproque.

3°) Soit H_t la projection orthogonale de O sur Δ_t. Calculer les coordonnées de H_t.
Montrer que la courbe décrite par H_t, pour $t \in \mathbb{R}$, est fermée et que sa longueur l vérifie :
$$8 \leq l \leq 4\sqrt{5}$$

4°) Déterminer et représenter sur 3 figures différentes les intersections de $\mathcal{S}$ avec les 3 plans de coordonnées.

5°) Déterminer des équations paramétriques de $\mathcal{S}$.
$\mathcal{S}$ est-elle une surface développable ?

6°) Montrer que $\mathcal{S}$ est incluse dans la surface Σ d'équation :
$$y^2(z^2 - x^2) - (z - x^2)^2 = 0$$
Existe-t-il des points de Σ n'appartenant pas à $\mathcal{S}$?

Exercice n°2 :

Soit $E = \mathbb{R}^2$, l'espace affine euclidien de dimension 2 rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

On définit les deux courbes suivantes :

C_1 par la représentation paramétrique : $t \mapsto \overrightarrow{OM}(t) = (t - th\,t)\,\vec{i} + \dfrac{1}{ch\,t}\,\vec{j}$

et C_2 par l'équation cartésienne : $y - ch\,x = 0$

où *ch* et *th* désignent respectivement les fonctions cosinus et tangente hyperboliques.

1°) Faire l'étude de la courbe C_1 (domaine de définition, symétries, sens de variations, branches infinies).
La construire dans E. (On pourra prendre 3 cm comme unité)

2°) Donner une équation de la droite Δ tangente à C_1 au point M de coordonnées $(x(t),y(t))$.
Soit T l'intersection de Δ et de la droite d'équation $y = 0$.
Montrer que la longueur du segment $[MT]$ est constante.

3°) On définit la fonction φ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\varphi(t) = t - 2\,th\,t \text{ pour tout } t$$

En faire l'étude (domaine de définition, symétries, sens de variations, branches infinies).
On montrera que la dérivée φ' s'annule sur $[0,+\infty[$ en un point t_0 tel que $ch\,t_0 = \sqrt{2}$.
Donner une valeur approchée de t_0 à 10^{-2} près et en déduire les valeurs approchées à 10^{-2} près des extremums relatifs de φ.

Tracer le graphe de φ.

4°) On considère la famille $(\Gamma_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ de courbes d'équation :

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x = 1 - \alpha^2$$

Préciser la nature de ces courbes.
Déduire de la question précédente qu'il existe un réel α_0 tel que, si $|\alpha| > \alpha_0$, l'intersection de C_1 avec Γ_α se réduit à deux points.
Donner une valeur approchée à 10^{-2} près de α_0.
Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, montrer que les tangentes à C_1 et à Γ_α en l'un des points d'intersection sont orthogonales.

5°) Tracer la courbe C_2.
Calculer le rayon de courbure en un point A d'abscisse a appartenant à la courbe C_2.
Déterminer une équation de la droite tangente à C_2 en A.

6°) Soient A_1 et A_2 deux points de la courbe C_2 d'abscisses a_1 et a_2 tels que les tangentes à C_2 aux points A_1 et A_2 soient orthogonales.
Si on note ρ_1 et ρ_2 les rayons de courbure aux points A_1 et A_2, calculer l'expression

$$\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2}$$

7°) Déterminer les développantes de C_2.
On appelle $\mathcal{D}$ la développante qui admet l'axe $(O,\vec{i})$ comme asymptote.
En donner une équation paramétrique. Comparer avec C_1.

Exercice n°3 :

Dans $\mathbb{R}^n$, on note . le produit scalaire usuel et $\|\ \|$ la norme associée.
Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des endomorphismes symétriques de $\mathbb{R}^n$ dont la matrice dans la base canonique, notée $A = (a_{ij})$, vérifie :

$$a_{ij} > 0 \quad \text{pour tout } i \text{ et tout } j \text{ variant de 1 à } n.$$

Soit f appartenant à $\mathcal{E}$.
f étant symétrique, on rappelle que ses valeurs propres sont réelles.
Soit α la plus grande d'entre elles.

1°) En utilisant une base orthonormée de vecteurs propres, établir l'inégalité :

$$f(x).x \leq \alpha \|x\|^2 \qquad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^n$$

Montrer que l'égalité n'est atteinte que si x est un vecteur propre associé à α.

En utilisant $\hat{x} = (|x_1|,\ldots,|x_n|)$, montrer de plus l'inégalité $|f(x).x| \leq \alpha \|x\|^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$

2°) Établir que $\alpha > 0$.
Montrer que si λ est une valeur propre de f alors on a $|\lambda| \leq \alpha$.

3°) Soit $x = (x_1,\ldots, x_n)$ un vecteur propre associé à α, montrer que $\hat{x} = (|x_1|,\ldots,|x_n|)$ est aussi un vecteur propre associé à α.
En déduire que, pour tout i variant de 1 à n, on a $x_i \neq 0$.
Démontrer que le sous-espace propre associé à α est de dimension 1 et que l'on peut choisir comme base un vecteur $\tilde{x} = (\tilde{x}_1,\ldots,\tilde{x}_n)$ vérifiant :

$\tilde{x}_i > 0$ pour tout i variant de 1 à n,

et $\sum_{i=1}^{n} \tilde{x}_i = 1$

On gardera cette notation $\tilde{x}$ dans la suite de l'exercice.

4°) En calculant la somme des composantes de $f(\tilde{x})$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$, établir l'égalité :

(*) $\alpha = \sum_{j=1}^{n} \tilde{x}_j C_j$

où $C_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$ est la somme des éléments de la j - ième colonne.

En déduire $\min_{j=1\ldots n} C_j \leq \alpha \leq \max_{j=1\ldots n} C_j$

5°) Démontrer, pour tout m entier, l'encadrement : $\min_{j=1\ldots m} \frac{p_j}{q_j} \leq \frac{\sum_{j=1}^{m} p_j}{\sum_{j=1}^{m} q_j} \leq \max_{j=1\ldots m} \frac{p_j}{q_j}$

où p_j et q_j sont des réels strictement positifs pour tout j variant de 1 à m.

6°) Si f appartient à $\mathcal{E}$, montrer que la composée $f^2 = f \circ f$ appartient aussi à $\mathcal{E}$ et que α^2 est la valeur propre maximale de f^2 associée au vecteur propre $\tilde{x}$.
En appliquant (*) à f et à f^2, établir l'égalité : $\alpha = \frac{\sum_{j=1}^{n} (\tilde{x}_j \sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_k)}{\sum_{j=1}^{n} \tilde{x}_j C_j}$

En déduire $\min_{j=1\ldots n} \frac{\sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_k}{C_j} \leq \alpha \leq \max_{j=1\ldots n} \frac{\sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_k}{C_j}$

7°) Soit f déterminée par sa matrice A dans la base canonique avec : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Déterminer la plus grande valeur propre α.
Donner les encadrements issus des questions 4°) et 6°).