CONCOURS COMMUN SUP 2000
DES ÉCOLES DES MINES D'ALBI, ALÈS, DOUAI, NANTES

Épreuve spécifique de Mathématiques
(filière MPSI)

Mardi 23 mai 2000 de 08h00 à 12h00

Instructions générales :

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4.
Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.
Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l'étiquette correspondant à l'épreuve et figurant sur leur convocation.

PROBLÈME D'ANALYSE

- $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est la $\mathbb{R}$-algèbre des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- L'objectif du problème est d'étudier les ensembles $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ suivants :

  $\mathscr{E} = \{ f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y) \}$.

  $\mathscr{F}$ est la partie constituée des éléments f de $\mathscr{E}$ tels que :
  - f n'est pas la fonction identiquement nulle.
  - f s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.

PARTIE I

1. Montrer que la fonction cosinus est dans l'ensemble $\mathscr{E}$.

2. On note ch la fonction cosinus hyperbolique et sh la fonction sinus hyperbolique. Démontrer la formule : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$.

En déduire que la fonction ch est dans l'ensemble $\mathscr{E}$.

3. Soit f dans $\mathscr{E}$; montrer que pour tout réel α, la fonction f_α de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par :

$x \mapsto f_\alpha(x) = f(\alpha x)$ est dans $\mathscr{E}$.

4. On fixe un élément f de $\mathscr{E}$.
En donnant à x et à y des valeurs particulières, prouver que :
a. $f(0)$ vaut 0 ou 1.
b. Si $f(0) = 0$, alors f est la fonction identiquement nulle.
c. Si $f(0) = 1$, alors f est une fonction paire.

PARTIE II

A. On fixe ici un élément f de $\mathcal{E}$ tel que $f(0)=1$.

1. Montrer que pour chaque réel $r>0$, on a :

a. $\forall x\in\mathbb{R},\ \int_0^r f(x+y)dy=\int_x^{x+r} f(u)du.$

b. $\forall x\in\mathbb{R},\ 2f(x)\int_0^r f(y)dy=\int_x^{x+r} f(u)du+\int_{x-r}^{x} f(v)dv.$

2. a. Montrer que l'on peut choisir $r>0$ de façon à rendre strictement positive la constante $\int_0^r f(y)dy$.

Dans la suite de ce **2.**, *on fixe un réel* $r>0$ *qui vérifie :* $\int_0^r f(y)dy>0.$

b. En déduire que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

c. Montrer alors que f est en fait de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

d. Prouver l'existence d'une constante $c>0$ telle que :

$$\forall x\in\mathbb{R},\ c\,f'(x)=f(x+r)-f(x-r).$$

3. En déduire l'existence d'une constante réelle λ telle que :

$$\forall x\in\mathbb{R},\ f''(x)=\lambda\,f(x).$$

B. Conclusion.

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle : $y''=\mu\,y.$, en séparant les cas : $\mu>0$, $\mu<0$ et $\mu=0$.

2. En déduire tous les éléments de $\mathcal{E}$ en exploitant le **I.4.c**.

3. Donner tous les éléments de $\mathcal{F}$.

PARTIE III

On se propose d'étudier l'ensemble $\mathcal{F}$ par une méthode différente.

On pourra utiliser librement le résultat suivant :

Si a est un élément fixé de $\mathbb{R}_+^*$ et si $D_a=\{\,a\frac{p}{2^q}\,/\,p\in\mathbf{Z},\ q\in\mathbb{N}\,\}$,

tout réel est limite d'une suite d'éléments de D_a.

Soit f un élément de $\mathcal{F}$. On pose $E=\{x>0\,/\,f(x)=0\}$.

A.

1. Montrer que $f(0)=1$, et que f s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Montrer que E admet une borne inférieure que l'on note a.

3. Prouver que $f(a)=0$ (on pourra raisonner par l'absurde). En déduire que : $a>0$.

4. Montrer que : $\forall x\in[0,a[,\ f(x)>0.$

B. On pose $\omega=\frac{\pi}{2a}$, et on note g la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$: $x\mapsto\cos(\omega x)$.

1. a. Soit $q\in\mathbb{N}$; montrer que : $f(\frac{a}{2^q})+1=2\left[f(\frac{a}{2^{q+1}})\right]^2.$

b. En déduire, en raisonnant par récurrence sur q, que : $\forall q \in \mathbb{N},\ f(\frac{a}{2^q}) = g(\frac{a}{2^q})$.

On démontrerait de même le résultat suivant que le candidat pourra utiliser librement :

si $q \in \mathbb{N}$ *est fixé :* $\forall p \in \mathbb{N},\ f(p\frac{a}{2^q}) = g(p\frac{a}{2^q})$.

2. Prouver que : $\forall x \in D_a,\ f(x) = g(x)$.

3. En déduire que $f = g$.

C. En déduire tous les éléments de $\mathcal{F}$.

PROBLÈME D'ALGÈBRE

Notations et objectifs :

- Soit n un entier, $n \geq 2$; on note $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la $\mathbb{R}$-algèbre des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels, et $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ la $\mathbb{R}$-algèbre des formes linéaires sur E.
  On rappelle que : $\dim(E) = \dim(E^*)$.
  Les éléments de E sont notés $M = (m_{ij})$, la matrice élémentaire E_{ij} est la matrice de E dont les coefficients sont tous nuls à l'exception de celui qui se trouve sur la i-ème ligne et sur la j-ème colonne, qui vaut 1.
  Lorsque A et B sont des éléments de E, on note $A.B$ leur produit.
  Si $M \in E$, on note $\text{vect}(M)$ le sous-espace vectoriel de E engendré par M.

- L'objectif du problème est de montrer que chaque hyperplan vectoriel de E possède au moins une matrice inversible.

- Si $M = (m_{ij}) \in E$, on note $T(M)$ le réel $\sum_{k=1}^{n} m_{kk}$.
  On définit ainsi une application T de E vers $\mathbb{R}$: $M \mapsto T(M)$.
  A chaque matrice U de E, on associe :
  - L'application T_U de E vers $\mathbb{R}$: $M \mapsto T_U(M) = T(U.M)$.
  - L'ensemble $H_U = \{ M \in E \,/\, T(U.M) = 0 \}$.

PARTIE I : Généralités, exemples

1. Quelques propriétés.

a. Montrer que T est une application linéaire.

b. Pour $U \in E$, prouver que l'application T_U est dans E^*.

c. Soit $U \in E$; reconnaître $\text{Ker}\, T_U$, et montrer que H_U est un sous-espace vectoriel de E.

2. *Dans cette question seulement*, on prend $n = 2$, et on pose $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a. Ecrire les quatre matrices élémentaires E_{ij} ; que peut-on dire de la famille $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ de $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

b. Montrer que H_U est l'ensemble des matrices de E dont la somme des quatre coefficients vaut 0.

c. Trouver une matrice M de E telle que $T(U.M) \neq 0$, et en déduire la dimension de $\text{Im}\, T_U$ puis la dimension de H_U.

d. Montrer que H_U possède une matrice inversible.
La partie **III** *propose une généralisation de ce résultat.*

PARTIE II : Quelques résultats utiles pour la suite

1. Soit $A=(a_{ij})$ et $B=(b_{ij})$ des éléments de E.

a. Montrer que $T(A\,.\,B)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ji}b_{ij}$.

b. En déduire les identités suivantes :

(I_1) $T({}^tA\,.\,B)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}$.

(I_2) $T(B\,.\,A)=T(A\,.\,B)$.

2. Soit U dans E.

a. Si U est la matrice nulle, déterminer $\dim H_U$.

b. Si U n'est pas la matrice nulle, montrer que l'on peut trouver un couple d'entiers (i_0, j_0) tel que $T_U(E_{i_0j_0})\neq 0$. En déduire $\dim H_U$.

3. Pour $(i, j)\in\{1, 2,..., n\}^2$, on note $T_{ij}=T_{E_{ji}}$.

a. Les indices k et l étant fixés, calculer $T_{ij}(E_{kl})$ en utilisant (I_1).

b. En déduire que les n^2 éléments T_{ij} de E^* permettent de définir une base de E^*.

4. Montrer que l'application φ de E vers E^* : $U\mapsto\varphi(U)=T_U$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

5. On considère un hyperplan vectoriel H de E.

a. Quelle est sa dimension ?

b. Soit A une matrice non nulle de E qui n'appartient pas à H, montrer que : $E=H\oplus\text{vect}(A)$.

c. Construire alors un élément l de E^* tel que $H=\text{Ker}\,l$.

d. Prouver l'existence d'un élément U de E tel que $H=H_U$.

PARTIE III : Le résultat général

Pour $1\leq r\leq n$, on note $R_r=\sum_{i=1}^{r}E_{ii}$.

1. Soit $P=\begin{pmatrix}0&0&.&0&1\\1&.&.&.&0\\.&.&.&.&.\\0&.&.&.&0\\0&0&.&1&0\end{pmatrix}$ c'est à dire $P=(p_{ij})$ avec $\begin{cases}p_{i+1\,i}=1,\ 1\leq i\leq n-1\\ p_{1n}=1\\ p_{ij}=0,\ \textit{ailleurs}\end{cases}$.

a. Montrer que P est inversible.

b. Prouver que P appartient à l'hyperplan H_{R_r}.

2. En déduire que chaque hyperplan vectoriel H de E possède au moins une matrice inversible.
Indication : lorsque $H=H_U$, avec U de rang r, on rappelle l'existence de matrices S_1 et S_2 inversibles telles que $S_1\,.\,U\,.\,S_2=R_r$.