Concours ENSAM - ESTP - ECRIN - ARCHIMEDE

Epreuve de Mathématiques 3 MP

durée : 4 heures

Problème

Préliminaires (définitions et rappels).

- Dans tout le problème E désigne un espace vectoriel de dimension finie sur le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes. On note n sa dimension et on suppose $n \geqslant 2$. On note $\mathcal{L}(E)$ son algèbre d'endomorphismes.
- Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si $\mathcal{B}$ est une base de E, on note $Mat(u, \mathcal{B})$ la matrice de u sur la base $\mathcal{B}$.
- Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout entier naturel p non nul, on note $u^p = \underbrace{u \circ \cdots \circ u}_{p\ fois}$. On pose $u^0 = Id$.
- Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on notera $P(u)$ l'application linéaire définie par : $\forall q \in \mathbb{N}\ ;\ P(u) = \sum_{0 \leqslant k \leqslant q} a_k u^k$ si $P(X) = \sum_{0 \leqslant k \leqslant q} a_k X^k$.
- Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, on appelle *commutant* de u l'ensemble $\mathcal{C}(u)$ des endomorphismes qui commutent avec u, on a :

$$\mathcal{C}(u) = \{v \in \mathcal{L}(E),\ u \circ v = v \circ u\}.$$

  On rappelle que $\mathcal{C}(u)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.
- On dit qu'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotent si et seulement si il existe un entier naturel non nul p tel que $u^p = 0$. Dans ce cas, le plus petit entier p vérifiant $u^p = 0$ est appelé *indice de nilpotence* de u.
- On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'algèbre des matrices carrées à n lignes et n colonnes et à coefficients dans le corps des nombres complexes $\mathbb{C}$.

Partie 0. Un exemple.

Dans cette partie, on considère la matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que : M est diagonale et ses coefficients diagonaux sont les n entiers consécutifs $1, 2, ..., n$. Ainsi, on a :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & 0 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 0 & . & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & n \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{C}(M)$ le sous-espace vectoriel formé par les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent avec M.

1. Démontrer que $\mathcal{C}(M)$ est l'ensemble des matrices diagonales.
2. En déduire la dimension de $\mathcal{C}(M)$.

Dans tout la suite du problème, u désigne un endomorphisme de E.

Partie I. Commutant d'un endomorphisme diagonalisable.

Si $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de u, on note $E_\lambda(u)$ le sous-espace propre associé : $E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda Id))$.
Dans cette partie, on suppose l'endomorphisme u diagonalisable. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p) \in \mathbb{C}^p$ ses valeurs propres. On a :

$$E = \bigoplus_{1 \leqslant i \leqslant p} E_{\lambda_i}(u).$$

On pose $n_i = \dim E_{\lambda_i}(u)$ pour $1 \leqslant i \leqslant p$.
Soit $\mathcal{B}$ une base de E. On rappelle que la base $\mathcal{B}$ est dite *adaptée* à la somme directe $E = \bigoplus_{1 \leqslant i \leqslant p} E_{\lambda_i}(u)$ s'il existe pour chaque entier i compris entre 1 et p, une base $(e_1^i, ..., e_{n_i}^i)$ du sous-espace vectoriel $E_{\lambda_i}(u)$ telle que $\mathcal{B} = (e_1^1, ..., e_{n_1}^1, e_1^2, ..., e_{n_2}^2, ..., e_1^p, ..., e_{n_p}^p)$.

1. Montrer que si $v \in \mathcal{C}(u)$ alors les sous-espaces $E_{\lambda_i}(u)$ sont stables par v.
2. Pour tout entier i compris entre 1 et p, on note u_i l'endomorphisme de $E_{\lambda_i}(u)$ induit par u. Que peut-on dire de u_i?
3. En déduire que $v \in \mathcal{C}(u))$ si et seulement si, sur une base $\mathcal{B}$ adaptée à la somme directe $E = \bigoplus_{1 \leqslant i \leqslant p} E_{\lambda_i}(u)$:

$$Mat(v, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} V_1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & V_2 & 0 & 0 & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & 0 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 0 & . & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & V_p \end{pmatrix}$$

avec $V_i \in \mathcal{M}_{n_i}(\mathbb{C})$ pour $1 \leqslant i \leqslant p$.

4. Montrer que $\dim \mathcal{C}(u) = \sum_{1 \leqslant i \leqslant p} n_i^2$.
5. Montrer que si u est diagonalisable, alors $\dim \mathcal{C}(u) \geqslant n$.
6. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable tel que $\dim \mathcal{C}(u) = n$.

Partie II. Commutant d'un endomorphisme nilpotent d'indice 2.

On suppose dans cette partie que u est nilpotent d'indice 2 et que $n \geqslant 2$. On note r le rang de u. On pose $s = n - 2r$.

1. Montrer que $\mathrm{Im}u \subset \ker u$. En déduire que $r \leqslant \dfrac{n}{2}$.

2. Soit G un supplémentaire de $\ker u$ dans E muni de la base $(e'_1, e'_2, \cdots, e'_r)$, montrer que la famille $(u(e'_1), u(e'_2), \cdots, u(e'_r))$ est une base de $\mathrm{Im}u$.

3. En utilisant un sous-espace vectoriel H de E tel que $\ker u = \mathrm{Im}u \oplus H$, montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}'$ de E telle que :

$$Mat\,(u, \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow r \\ \updownarrow s \\ \updownarrow r \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} \overleftrightarrow{r} & \overleftrightarrow{s} & \overleftrightarrow{r} \end{matrix}$$

I_r désigne la matrice identité d'ordre r.

4. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$; la matrice de v dans la base $\mathcal{B}'$ est définie par blocs en posant :

$$Mat\,(v, \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow r \\ \updownarrow s \\ \updownarrow r \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} \overleftrightarrow{r} & \overleftrightarrow{s} & \overleftrightarrow{r} \end{matrix}$$

Montrer que $v \in \mathcal{C}(u)$ si et seulement si

$$\begin{cases} A_4 = 0_{s,r} \\ A_7 = 0_{r,r} \\ A_8 = 0_{r,s} \\ A_9 = A_1 \end{cases}$$

$0_{p,q}$ désignant la matrice nulle à p lignes et q colonnes.

5. En déduire la dimension de $\mathcal{C}(u)$ en fonction de n et de r. Montrer que : $\dim \mathcal{C}(u) \geqslant \dfrac{n^2}{2}$.

Partie III. Commutant d'un endomorphisme u vérifiant la relation (1) :

$$(1) \qquad (u - Id) \circ (u - 2Id)^2 = 0.$$

Id désigne l'application identique de E. On rappelle que :
$(u - 2Id)^2 = (u - 2Id) \circ (u - 2Id)$.

On pose $E_1 = \ker(u - Id)$ et $E_2 = \ker(u - 2Id)^2$, $n_1 = \dim E_1$ et $n_2 = \dim E_2$, on suppose de plus $n_1 \geqslant 1$, $n_2 \geqslant 1$ et $n \geqslant 2$.

1. Montrer en rappelant le théorème utilisé que :

$$E = E_1 \oplus E_2 .$$

On note p_1 le projecteur sur E_1 parallèlement à E_2 et p_2 le projecteur sur E_2 parallèlement à E_1.

Tournez la page S.V.P.

2. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{1}{(X-1)(X-2)^2}$$

En déduire deux polynômes U et V tels que :

$$1 = U(X)(X-1) + V(X)(X-2)^2 \quad , \deg U < 2 \text{ et } \deg V < 1.$$

3. Montrer que $p_1 = V(u) \circ (u - 2Id)^2$ et $p_2 = U(u) \circ (u - Id)$.

4. On note $d = p_1 + 2p_2$; montrer que d est diagonalisable.

5. Soit $w = u - d$. Calculer w^2, en déduire que $w = 0$ ou w est nilpotent d'indice 2.

6. Détermination de $\dim \mathcal{C}(u)$.

   (a) Montrer que : $v \in \mathcal{C}(u)$ si et seulement si $v \in \mathcal{C}(d)$ et $v \in \mathcal{C}(w)$.

   (b) Déterminer les restrictions de w à E_1 et E_2 respectivement. En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que

$$Mat(w, \mathcal{B}) = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} \\ \overbrace{}^{n_1} \quad \overbrace{}^{n_2} \end{array} \begin{array}{l} \updownarrow n_1 \\ \updownarrow n_2 \end{array}$$

   où N est la matrice de l'endomorphisme induit par $(u - 2Id)$ sur E_2 sur une base de E_2.

   (c) Montrer que le rang de la matrice N est égal à $n_2 - \dim(\ker(u - 2Id))$.

   (d) Montrer que $v \in \mathcal{C}(u)$ si et seulement si

$$Mat(v, \mathcal{B}) = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} V_1 & 0 \\ 0 & V_2 \end{pmatrix} \\ \overbrace{}^{n_1} \quad \overbrace{}^{n_2} \end{array} \begin{array}{l} \updownarrow n_1 \\ \updownarrow n_2 \end{array}$$

   et

$$V_2 N = N V_2.$$

   (e) Montrer que u est diagonalisable si et seulement si $N = 0$.

   (f) On suppose u non diagonalisable, déterminer $\dim \mathcal{C}(u)$ en fonction de n_1, n_2 et $\dim(\ker(u - 2Id))$.

IMPRIMERIE NATIONALE. – D'après documents fournis.